

SMERNICE ZA CEPLJENJE PSOV

**PASJA KUGA
PARVOVIROZA
ADENOVIRUSNI HEPATITIS**



**NUJNO
CEPLJENJE**

1. CEPLJENJE

mladič < 16 tednov

pri 8 tednih

po 4 tednih

pri vsaj 16 tednih

psi > 16 tednov

enkratno začetno cepljenje

PONOVITEV CEPLJENJA

po 6–12 mesecih



nato **NE POGOSTEJE** kot vsake 3 leta
ali preverjanje protiteles



LEPTOSPIROZA

1. CEPLJENJE

po 8 tednih starosti
ne glede na starost psa
ali kadar zgodovina cepljenja ni znana ali popolna

dva zaporedna odmerka
v razmiku 2–4 tedne

PONOVITEV CEPLJENJA

po 12 mesecih

nato vsakih 12 mesecev

**PRIPOROČLJIVO
CEPLJENJE**
glede na
življenjski slog
psa



POMEMBNO JE VEDETI


**Revakciniramo vedno
z istimi serovari.**

Če uporabimo cepivo z drugimi serovari,
moramo psa ponovno cepiti 2x zapored
z novimi serovari ne glede na starost živali.
Za imunost morata biti vedno dva začetna
zaporedna odmerka z istimi serovari –
ni navzkrižne zaščite pred
različnimi serovari
leptospire.



LEPTOSPIROZA

zakasnela revakcinacija



>6 tedenski interval med dvema začetnima cepljenjema

Ni objavljenih študij za tovrstne primere. Svetuje se ponovno zaporedno dvakratno cepljenje.

revakcinacija kasneje kot po 12 mesecih

Ni objavljenih študij za tovrstne primere. Ali revakciniramo enkrat ali dvakrat se odločimo glede na epizootiološko situacijo in življenjski slog psa.

Serovari leptospire, ki jih vsebujejo cepiva proti leptospirozi in kombinirana cepiva registrirana v Sloveniji leta 2020

Pojavnost posameznih serovarov leptospire v Sloveniji*

vir: Laboratorij za leptospirozo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani

Vanguard plus 7*	Nobivac Lepto	Eurican Lmultli	Eurican DAPPI-L, DAPPI-LR	Canigen DHPPI/L	Biocan Novel DHPPI/LAR, Pi/L4, DHPPI/L4	Serovar	10 %	20 %	30 %	40 %
●	●	●	●	●	●	Icterohaemorrhagiae				
						Pomona				
		●			●	Grippytyphosa				
●	●	●	●	●	●	Canicola				
						Autumnalis				
					●	Bratislava				
						Australis				
						Sejroe				
						Saxkoebing				
						Tarassovi				
						Hardjo				
						Bataviae				



*Tekoča komponenta cepiva vsebuje poleg leptospire tudi parvovirus, zato psa ne moremo cepiti samo proti leptospirozi.

*Psi z morebitnimi protitelesi po zaščitnem cepljenju niso izvzeti.

Podrobneje



bit.ly/WSAVavacc
WSAVA



bit.ly/AAHAavacc
AAHA



Veterinarska zbornica Slovenije